# Front and Back 5kg



## **Dekalidad na Binhing Palay**

VARIETY	1
DATE OF HARVEST	1
SEED CLASS	i
LOT NUMBER	<u> </u>
PLANT BEFORE	1

TIMBANG: 5kg

PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE Maligaya, Science City of Muñoz, 3119 Nueva Ecija Tel. No: (044) 4560-285; 4560-258 loc 601 Email: bdd@philrice.gov.ph Website: http://www.philrice.gov.ph

# Front and back 10kg



# **Dekalidad na Binhing Palay**

VARIETY	
DATE OF HARVEST	<u>:</u>
SEED CLASS	:
LOT NUMBER	:
PLANT BEFORE	

TIMBANG: 10kg

PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE Maligaya, Science City of Muñoz, 3119 Nueva Ecija Tel. No: (044) 4560-285; 4560-258 loc 601 Email: bdd@philrice.gov.ph Website: http://www.philrice.gov.ph Paraan para masiguro ang pagsibol ng mga buto:

- 1. Isalin sa malinis at malaking sako (para sa pag-alsa) ang mga binhi at pagkatapos ay hugasan ng malinis na tubig.
  2. Ibabad ang mga binhi sa malinis na tubig ng 24-36 oras o hanggang umalsa. Maaaring ibabad sa "drum" o sa lugar na may umaagos na tubig.
  3. Palitan ng malinis na tubig ang pinagbabaran kada 6 na oras kung ito ay ibinabad sa drum para hindi mabulok ang mga ito.
  4. Pagkatapos ibabad, hugasan ang mga binhi, ilagay sa maluwag na sako, ilagay sa paleta at takluban ng dayami. Kulubin ng 24 na oras o hanggang may makita na kulay puti na lumalabas mula sa buto. Upang hindi masobrahan sa init ang mga binhi, buhusan ng malinis na tubig ang mga sako kada 6 na oras.

## Paghahanda ng kamang punlaan at pagpupunla:

- 1. Habang kinukulob ang mga binhi, gumawa ng 400 metro kuwadradong kamang punlaan para sa bawat 20 kilos na binhi. Maghanda ng nakaangat na kamang punlaan na 1 metro ang lapad at ayon sa inyong gusto/nais na haba.
  2. Bago patagin ang kamang punlaan, maglagay ng 10-15 sako ng organikong pataba.
  3. Pagkatapos, isabog ang mga pinasibol na binhi (50 gramo o isang dakot) sa bawat metro kuwadrado.

## Pagpapatunay:

STORE IN DRY AND COOL PLACE AVOID DIRECT EXPOSURE TO SUNLIC TRANSPORT IN DRY AND COVERED A

DRY AND GOOL PLACE T EXPOSURE TO SUNLIGHT N DRY AND COVERED AREA

STORE IN DE AVOID DIRECT E TRANSPORT IN E

Pinaninindigan ng PhilRice na taglay ng mga binhi ang lahat ng mga katangiang nakalahad sa seed tag at sa sako, ayon sa mga pamantayang pinaiiral ng industriya ng binhing palay.

# Paalala at Disclaimer: Sa anumang mapatunay

a anumang mapatunayang di angkop sa nabiling binhi, aalam lamang po sa loob ng 7 araw pagkabili nito. Gayun in, hindi saklaw ng PhilRice ang magiging tindig at ani ng alay sa inyong lugar.

Text Centur: 0917-113-743 Agussen Tel (095) 343-3778; 343-0769; Email: agussen station@phirice.gov.p stace. Tel (075) 767-1882; 870-1867; Email: batac.station@phirice.gov.ph stacel = Email: blccl.station@phirice.gov.ph sabeta = Email: isabela.station@phirice.gov.ph los Bandos - Tel: (049) 536-8520; 501-16-300 ph

# Paraan para masiguro ang pagsibol ng mga buto:

- Isalin sa malinis at malaking sako (para sa pag-alsa) ang mga binhi at pagkatapos ay hugasan ng malinis na tubig.
   Ibabad ang mga binhi sa malinis na tubig ng 24-36 oras o hanggang umalsa. Maaaring ibabad sa "drum" o sa lugar na may umaagos na tubig.
   Palitan ng malinis na tubig ang pinagbabaran kada 6 na oras kung ito ay ibinabad sa drum para hindi mabulok ang mga ito.
- oras kung ito ay ibinabad sa drum para hindi mabulok ang mga ito.

  4. Pagkatapos ibabad, hugasan ang mga binhi, ilagay sa maluwag na sako, ilagay sa paleta at takluban ng dayami. Kulubin ng 24 na oras o hanggang may makita na kulay puti na lumalabas mula sa buto. Upang hindi masobrahan sa init ang mga binhi, buhusan ng malinis na tubig ang mga sako kada 6 na oras.

# Paghahanda ng kamang punlaan at pagpupunla:

- Habang kinukulob ang mga binhi, gumawa ng 400 metro kuwadradong kamang punlaan para sa bawat 20 kilos na binhi. Maghanda ng nakaangat na kamang punlaan na 1 metro ang lapad at ayon sa inyong gusto/nais na haba.
   Bago patagin ang kamang punlaan, maglagay ng 10-15 sako ng organikong pataba.
   Pagkatapos, isabog ang mga pinasibol na binhi (50 gramo o isang dakot) sa bawat metro kuwadrado.

## Pagpapatunay:

Pinaninindigan ng PhilRice na taglay ng mga binhi ang lahat ng mga katangiang nakalahad sa seed tag at sa sako, ayon sa mga pamantayang pinaliral ng industriya ng binhing palay.

## Paalala at Disclaimer:

Padata at Disclaimer.

Sa anumang mapatunayang di angkop sa nabiling binhi, ipaalam lamang po sa loob ng 7 araw pagkabili nito. Gayun din, hindi saklaw ng PhilRice ang magiging tindig at ani ng palay sa inyong lugar.

9-8178; 229-7242; Email: midsayap, station@piner.cog station@pinitice.gov.ph le No. 09163676086 / 09096229813 920-5129 n - Alacaak, Sta. Cruz, 5105, Occidental Mindoro - UEP Campus, Catarman, 6400, Northern Samar attion - WMSU Campus, San Ramon, Zamboanga City



# Front and Back page 20kg



## **Dekalidad na Binhing Palay**

VARIETY	•
DATE OF HARVEST	
SEED CLASS	
LOT NUMBER	:
PLANT BEFORE	:

TIMBANG: 20kg

PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE
Maligaya, Science City of Muñoz, 3119 Nueva Ecija
Tel. No: (044) 4560-285; 4560-258 loc 601
Email: bdd@philrice.gov.ph
Website: http://www.philrice.gov.ph

# DRY AND COOL PLACE T EXPOSURE TO SUNLIGHT N DRY AND COVERED AREA STORE IN DR AVOID DIRECT E TRANSPORT IN D

## Paraan para masiguro ang pagsibol ng mga buto:

- 1. Isalin sa malinis at malaking sako (para sa pag-alsa) ang mga binhi at pagkatapos ay hugasan ng malinis na tubig.
  2. Ibabad ang mga binhi sa malinis na tubig ng 24-36 oras o hanggang umalsa. Maaaring ibabad sa "drum" o sa lugar na may umaagos na tubig.
  3. Palitan ng malinis na tubig ang pinagbabaran kada 6 na oras kung ito ay ibinabad sa drum para hindi mabulok ang mga ito.
  4. Pagkatapos ibabad, hugasan ang mga binhi, ilagay sa maluwag na sako, ilagay sa paleta at takluban ng dayami. Kulubin ng 24 na oras o hanggang may makita na kulay puti na lumalabas mula sa buto. Upang hindi masobrahan sa init ang mga binhi, buhusan ng malinis na tubig ang mga sako kada 6 na oras.

## Paghahanda ng kamang punlaan at pagpupunla:

- Habang kinukulob ang mga binhi, gumawa ng 400 metro kuwadradong kamang punlaan para sa bawat 20 kilos na binhi. Maghanda ng nakaangat na kamang punlaan na 1 metro ang lapad at ayon sa inyong gusto/nais na haba.
   Bago patagin ang kamang punlaan, maglagay ng 10-15 sako ng organikong pataba.
   Pagkatapos, isabog ang mga pinasibol na binhi (50 gramo o isang dakot) sa bawat metro kuwadrado.

## Pagpapatunay:

Pinaninindigan ng PhilRice na taglay ng mga binhi ang lahat ng mga katangiang nakalahad sa *seed tag* at sa sako, ayon sa mga pamantayang pinaliral ng industriya ng binhing palay.

Paalala at Disclaimer:
Sa anumang mapatunayang di angkop sa nabiling binhi, ipaalam lamang po sa loob ng 7 araw pagkabili nito. Gayun din, hindi saklaw ng PhilRice ang magiging tindig at ani ng palay sa inyong lugar.

Gi. (853): 3-3-0-0.

Gi. (953): 3-3-0-0.

Gi. (970): 1882; 670-1867; Email: botalistic agovph

ail: bicol station@philirice, govph

s. Tel: (949): 538-9620; 591-1917; Email: losbanos@philirice.govph

rel: (964): 293-8178; 229-7422; Email: midsayap station@philirice.govph

sc CMU - Mobile No. 99163676086 ( 09908229813

ffice - rel: (02): 920-5128

Satellite Station - Alacask, Sta. Cruz, 5105, Occidental Mindoro

stellite Station - LEP Campus, Catarman, \$400, Northern Samar

ga Satellite Station - WMSU Campus, San Ramon, Zamboanga City

ga Satellite Station - WMSU Campus, San Ramon, Zamboanga City